



## Message d'information

### Myopathie Atypique - Bilan au 15 octobre 2018

lundi 15 Octobre 2018

A ce jour et pour ce deuxième semestre 2018, le RESPE a recensé 3 suspicions de Myopathie atypique par ses Vétérinaires Sentinelles (toutes 3 en juillet) : 2 cas dans l'Allier (03), 1 cas dans l'Orne (61).

Vous trouverez ci-dessous le message d'information de l'AMAG.



*Samares d'érable sycomore (ACER PSEUDOPLATANUS)*

Le nombre de cas de myopathie atypique ne cesse d'augmenter ces derniers jours. Merci de transmettre le message ci-dessous à vos connaissances via votre page Facebook.

Invitez vos contacts du milieu équestre à s'inscrire pour recevoir les messages d'alerte via le site officiel géré par des chercheurs de l'Université de Liège : <http://www.myopathie-atypique.be>

Si vous avez connaissance d'un cas, MERCI de le déclarer :

- en tant que propriétaire, via le lien <http://labos.ulg.ac.be/myopathie-atypique/questionnaire-propretaire/>

- en tant que vétérinaire, via le lien <http://labos.ulg.ac.be/myopathie-atypique/veterinaire/formulaire-veterin...>

AUTOMNE 2018 – A la date du 14 octobre 2018, 57 cas compatibles avec le diagnostic de myopathie atypique ont été communiqués à la Faculté de Médecine vétérinaire de Liège et au RESPE. Ces cas ont été recensés en Autriche (1 cas), en Belgique (42 cas), en France (4 cas), en Grande Bretagne (1 cas), au Pays-Bas (2 cas), en République Tchèque (3 cas), en Suisse (2 cas) et en Allemagne (2 cas).

Les conditions climatiques saisonnières sont propices à l'émergence de cas de myopathie atypique. Aujourd'hui nous savons que la toxine responsable de la myopathie atypique est présente dans les graines de certains érables dont l'Acer pseudoplatanus (= érable sycomore) (<http://labos.ulg.ac.be/myopathie-atypique/maladie/>). Donc, il est primordial d'éviter que les équidés (chevaux, ânes, zèbres...) les ingèrent. Avec le changement de température, les graines commencent à tomber et le risque d'intoxication est important. Dans la limite du possible, il faut limiter l'accès aux pâtures qui contiennent des érables. Dans le lien ci-dessous, vous trouverez des informations (en français) relatives à la myopathie atypique. Attention, le vent disperse les graines : il est important de parcourir votre prairie pour vous assurer qu'elle n'en contient pas.

[http://www.farah.ulg.ac.be/cms/c\\_28271/fr/myopathie-atypique-chevaux-en-...](http://www.farah.ulg.ac.be/cms/c_28271/fr/myopathie-atypique-chevaux-en-...)

Très cordialement,

L'équipe de l'AMAG