

**Prélèvements obligatoires inscrits dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français - 2018**

*Préconisations de la Fédération des Eleveurs du Galop*

Analyses à faire effectuer dans un laboratoire agréé

		<b>POUR LA JUMENT</b> Tests à faire à partir du 1er janvier 2018 et avant toute saillie		<b>POUR L'ETALON</b> Tests à faire à partir du 1er décembre 2017
TAYLORELLA KLEBSIELLA PSEUDOMONAS (obligatoire)	Site	Clitoris (sinus et/ou fosse)	Col utérin	Site : fosse urétrale
	VIDE OU MAIDEN	Taylorella négatif : OK  Klebsiella/Pseudomonas positif => voir traitement avec vétérinaire et typage capsulaire Klebsielle conseillé	Taylorella négatif : OK  Klebsiella/Pseudomonas positif => voir traitement avec vétérinaire et typage capsulaire Klebsielle conseillé  Flore associée par culture interprétation par vétérinaire	Taylorella négatif : OK  Klebsiella/Pseudomonas positif => voir traitement avec vétérinaire et typage capsulaire Klebsiella conseillé
	PLEINE ET SUITEE	Moins de 30 jours avant poulinage  Taylorella négatif : OK  Klebsiella/Pseudomonas positif => voir traitement avec vétérinaire et typage capsulaire Klebsielle conseillé	A faire sur chaleur (dont de poulinage)  Taylorella négatif : OK  Klebsiella/Pseudomonas positif => voir traitement avec vétérinaire et typage capsulaire Klebsielle conseillé  Flore associée par culture interprétation par vétérinaire	
ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE	1 résultat sérologique négatif : OK  2 résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle : OK  1 résultat sérologique positif stable ou déclinant par rapport à 1 résultat de N-1 ou N-2, un laboratoire différent est toléré : OK  <i>Test datant de moins de 60 jours</i>		1 résultat sérologique négatif : OK 1 résultat sérologique positif avec certification de vaccination conforme : OK 1 résultat sérologique positif sans certification de vaccination conforme, Effectuer : - virologie sur sperme avec résultat négatif : OK - virologie positive, étalon excréteur => protocole spécifique <i>Suite rupture ARTERVAC en 2018, effectuer une surveillance AVE des étalons pendant la saison :</i> <i>- 1 séroneutralisation avant rupture</i> <i>- 2 séroneutralisations de contrôle pendant la monte (avril et juin) :</i> <i>si titre stable ou déclinant : OK</i> <i>si titre croissant faire virologie sur sperme</i>	
ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS			Test de Coggins ou ELISA : 1 résultat négatif datant de moins de 3 mois pour 1 <sup>ère</sup> monte, puis test renouvelé tous les 3 ans	
DOURINE			1 résultat sérologique négatif (Fixation Complément) de moins de 3 mois si séjour dans les 12 derniers mois dans pays non indemne de Dourine	

**Vaccinations obligatoires inscrites dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français - 2017**

	Avant la saillie	Avant la demande de carnet de monte
GRIPPE	Vaccination préalable à la DPS et < 1 an : ok Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines 1er rappel à 6 mois, puis un rappel au moins annuel : ok	Vaccination préalable à la demande de carnet et < 1 an : ok Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines 1er rappel à 6 mois, puis un rappel au moins annuel : ok
RHINOPNEUMONIE	Vaccination préalable à la DPS et < 1 an : ok Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines, 1er rappel à 6 mois, puis rappel au moins annuel (mieux tous les six mois) : ok	Vaccination préalable à la demande de carnet et < 1 an : ok Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines, 1er rappel à 6 mois, puis rappel au moins annuel (mieux tous les six mois) : ok

Toute rupture dans un protocole de vaccinations nécessite une nouvelle primo-vaccination

**Vaccination fortement recommandée inscrite dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français - 2017**

	Vaccination Etalon et Boute-en-train
ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE	EQUIP ARTERVAC® Sérologie négative étalon maintenu en isolement primo-vaccination par 2 injections entre 3 et 6 semaines rappel tous les 6 mois (tolérance + 2 mois)  Pour reprendre la vaccination après une rupture du protocole : Si sérologie négative voir supra Si sérologie positive : faire virologie sur sperme Si virologie négative : reprise vaccination Refaire primo-vaccination si rupture > 1 an

**TECHNIQUES D'ANALYSE**

TAYLORELLA	CULTURE OU PCR OK pour 6 pays signataires Common Code of Practice Pour Newmarket analyses à réaliser par laboratoire agréé HBLB (en France, LABÉO Frank Duncombe) IMMUNOFLUORESCENCE (IF) OK UNIQUEMENT en France	CULTURE OU PCR OU IF : OK
KLEBSIELLA PSEUDOMONAS	CULTURE OU PCR OK pour 6 pays signataires Common Code of Practice	CULTURE OU PCR : OK
ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE	SERONEUTRALISATION OU ELISA si séropositive faire 2 séroneutralisations	SERONEUTRALISATION OU ELISA si vacciné faire séroneutralisation
ANÉMIE INFECTIEUSE		COGGINS OU ELISA (non agréé en France) accepté pour les étalons en provenance d'autre Etat Membre test réalisé dans autre Etat Membre moins de 3 mois avant 1ère monte renouvelé tous les 3 ans